

LEISHMANIOSIS

Az állatokon szimmetrikus vagy helyi szőrhiány mutatkozik a fülön, a szemkörnyéken és a farkon. Az orrháton száraz, pikkelyes hámló terület, a mancsokon, fülkagylón fekélyes bőrgyulladás jelenik meg. A betegség jellemzője a fokozott körömszaru-képződés. Az igazi veszély, hogy a kórfolyamatokban képződő és a vérben keringő immunkomplexek lerakódnak a belső szervekben, és vese-, ér-, izület- és szemkárosodást okozhatnak.

A betegség egyébként zoonosis, azaz ember is elkaphatja a kutyáktól. Dum-dum fever, kalaazar, keleti fekély néven is emlegetik azt a kórt, amitől a világon 12 millió ember szenved. Leismaniában, évente 1-1,5 millió új fertőzést regisztrálnak.

A kutyára veszélyt jelentő leishmaniosis-szal szemben létezik hatékony ellenszer, amely a betegség kialakulása ellen nyújt védelmet. A speciálisan lepkeszúnyogok és kullancsok távol tartására és csípésük elleni védelemre kifejlesztett nyakörvvel legalább féléves védelmet biztosíthatunk kedvencünk számára. A már említett Scalibor gyógyszeres nyakörv különlegessége a hatóanyag-felszabadulás módja: a deltametrin folyamatos utánpótlás mellett, közvetlenül a kutya szőrzetére kerül ellentétben a hagyományos „bolhanyakörvekkel”, amelyek hatóanyaga párolgás útján szabadul fel, így jelentős része a levegőbe kerül.

A szagtalan nyakörvet az utazás előtt 10-14 nappal kell a kutyára tenni. Használata során kerülni kell az állat samponnal vagy szappannal történő lemosását, de a fürdés, pancsolás megengedett a kutyák számára. A hatóanyag az emberre és a melegvérű állatokra ártalmatlan, kisgyerek, vagy kiskutya közelében is használható.

Betegséget terjesztő szúnyogok: Lepkeszúnyogok családja (*Psychodidae*)