

HÁZI SZÚNYOGIRTÁS

A ház körüli mesterséges vizekben szaporodnak a Dalos szúnyogok (*Culex pipiens pipiens*) és a Házi szúnyogok (*Culex pipiens molestus*) lárvái. Tipikus tenyészhely az esővízgyűjtő hordó, ezekben mindig megtalálhatjuk ezeket. Nyáron, a nagy melegben fejlődési ciklusuk 6 nap is lehet, ezért gyakran kellene cserélni a vizet, hogy ne fejlődjenek ki, a vérszívók. Csapadékos időjárásakor, nem öntözünk, ezért érdemes ezeket, a hordókat lefedni, vagy biológiai szúnyoglárvairtó szerrel kezelni.



Házi szúnyog tenyészhely kezelése biológiai lárvairtó szerrel

Nagyobb nyári esőzések hatására hamar megtelnek a kinnfelejtett virágcserepek, ezek is kiváló tenyészhelyekké válhatnak. De ilyen lehet a kidobott konzervdoboz és az elhasznált autógumi. Az Ázsiai tigrisszúnyog, amely a déli országokból közelít hazánk felé ezekben kiválóan, szaporodik.



Alul zárt cserepeket fordítsuk fel, mert ebben a kis vízben is sok szúnyoglárva fejlődhet

A házi szúnyogok több millió utódot képesek létrehozni, nem távolodnak messzire a tenyésző helyüktől, így egész nyáron kellemetlenkedhetnek. Este a meleget és a kilélegzett CO₂-t megérezve berepülnek a szobába, zümmögésükkel, vérszívásukkal megkeserítve az éjszakai nyugalmunkat.

A házi szúnyogok nőtényei a telet pincékben, fészerekben, garázsokban vészélik át és kedvező időjárás esetén, egész télen aktívak maradhatnak. Kora tavasszal az „éhes” nőtény szúnyog agresszíven támadja a ház lakóit. Megelőzhetjük a támadásokat, ha megszüntetjük a nyári tenyészőhelyeket, késő ősszel pedig a telelő helyeket rovarirtó spray-vel befűjjük.



Késő ősszel a házi szúnyogok pincékbe vonulnak telelni

A házi szúnyogok nemcsak vérszívásukkal okoznak kellemetlenséget, megtalálhatók szennyezet vagy szennyvizekben is, így az elvakart csípés könnyen elfertőződhet. A dalos szúnyog terjeszti a nyugat-nílusi láz-t, amely vadmadarakat, libákat, lovakat és embert is megbetegít. Ez a szúnyogfaj elsősorban a madarak vérével táplálkozik, de nyár végén, amikor a költöző madarak délre vonulnak, az emberre is ráfanyalodik, átvive a vírust. A nyugat-nílusi vírusfertőzés esetében kb. négy-öt ezer fertőzésre, jut egy idegrendszeri tünetekben megnyilvánuló betegség; a fertőzések jelentős része, kb. 80 százaléka tünetmentes, és az esetek kevesebb, mint 20 százalékában influenzaszerű, általános lázas tünetek jelentkeznek.